




VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y FEMINIZACIÓN DEL VIH/SIDA EN ARGENTINA

Dos caras de una misma realidad: violencia contra las mujeres y feminización del VIH/SIDA en el MERCOSUR es un proyecto que se desarrolla desde el 2008 en cuatro países del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Tiene como objetivo central visibilizar la magnitud de las intersecciones entre la violencia hacia las mujeres y el VIH/SIDA y promover políticas públicas que enfrenten de manera integral la atención y la prevención de ambas. En el 2008 se recopiló información secundaria y se llevó a cabo una investigación en cada país.



La investigación es un estudio cuanti-cualitativo exploratorio y descriptivo, para explorar la existencia de situaciones de violencia en mujeres que viven con VIH/SIDA y las vinculaciones entre ambas. En Argentina, el trabajo de campo se desarrolló entre los meses de Octubre a Diciembre de 2008. La encuesta se aplicó a 101 mujeres viviendo con VIH, mayores de 18 años que reciben asistencia en servicios de salud públicos de la Ciudad de Buenos Aires y del área norte y oeste del conurbano bonaerense, en la Provincia de Buenos Aires.

Que observamos:

- Escasa y dispersa información estadística sobre violencia contra las mujeres, y en especial sobre violencia sexual.
- Respecto al VIH, en el 2006 la razón hombre/mujer disminuyó a 2,4 hombres por mujer en casos de SIDA y en las infecciones de VIH de 1,5 hombres por mujer. En el 2006 el 62,9% de las transmisiones fue por relaciones heterosexuales.
- No hay programas gubernamentales que articulen las estrategias para mitigar la violencia y el VIH/Sida en las mujeres. Solo en algunas jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, Rosario y otros) se incorporó el protocolo de atención de las víctimas de violencia sexual con la provisión de Anticoncepción Hormonal de Emergencia -AHE- para disminuir el riesgo de embarazo y también la profilaxis Post Exposición para prevenir el VIH.
- La prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres se brinda de forma fragmentada y desarticulada, tanto entre los organismos específicos de atención a esta problemática, como entre éstos y los servicios de salud.
- No existen políticas públicas para integrar el VIH/Sida en la atención de la salud sexual y reproductiva. La atención de la salud sexual y reproductiva y el VIH se realiza a través de programas separados con poca vinculación.
- No existe un protocolo nacional que normatice la atención de las víctimas de violencia sexual que especifique, la provisión de AHE (anticoncepción hormonal de emergencia), de la Profilaxis Post Exposición para prevención del VIH, y la atención psico-social.



VIH/SIDA+VIOLENCIA



Principales hallazgos cuantitativos:

- El 93.1% de las encuestadas refirieron haber padecido situaciones de violencia:
 - 87,7% violencia psicológica.
 - 76,2% sufrió violencia física.
 - 43.6% violencia sexual.
 - 36,6% sufrió abuso en la niñez.
- Las diferentes formas de violencia suelen presentarse en forma asociada:
 - 29,8% sufrió violencia psicológica y física.
 - 18,1% sufrió violencia psicológica, física y sexual.
 - 22,4% sufrió violencia psicológica, física, sexual y abuso infantil.
- De las 37 mujeres que sufrieron abuso sexual infantil el 97.3% sufrió luego otros tipos de violencia en su vida.
- El porcentaje de situaciones de violencia se distribuye de manera equitativa en todos los grupos socioeconómicos.
- En todas las formas de violencia indagadas los hombres, específicamente parejas, maridos y familiares cercanos son señalados como los principales agresores. La violencia psicológica es ejercida en el 76.4% de los casos por ex maridos o ex parejas o por marido o pareja actual. En el caso de la violencia física en el 89.7%
- El 81.9% de los casos de violencia sexual los agresores fueron personas del entorno íntimo de las mujeres: maridos, parejas, padres, tíos, hermanos.
- El 79.2% de las encuestadas padecieron alguna forma de violencia antes del diagnóstico de VIH
- De las encuestadas que padecieron violencia física un 57,4% la padeció antes del diagnóstico de VIH, un 68,3% en el caso de la violencia psicológica y un 67,3% en el caso de la violencia sexual.
- La mayor incidencia de violencia se registró en edades jóvenes.
- Casi el 70% de las encuestadas presenciaron violencia hacia su madre por parte de su marido, pareja o novio durante la niñez.
- En relación a las lesiones recibidas en el transcurso de la historia de violencia, un 52.08% refirió una frecuencia entre una y dos veces y 33.33% refirió más de cinco veces.

Noviembre 2009

