



COMUNICADO DE PRENSA - 18/7/2010

FEIM EN LA XVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA
18 AL 23 DE JULIO DE 2010 - VIENA

LAS MUJERES SON MAS VULNERABLES AL SIDA

En las nuevas infecciones por VIH en jóvenes de 15 a 24 años predominan las mujeres. Las desigualdades de género son un factor de riesgo para contraer el virus. Una nueva coalición mundial femenina exige tener en cuenta a las mujeres y las niñas en la respuesta a la epidemia

"No más palabras, no más resoluciones... necesitamos actuar YA". Esta es la principal demanda que exige una nueva coalición internacional de mujeres a los gobiernos del mundo para que cumplan con sus compromisos con respecto al sida e implementen políticas de prevención y asistencia especiales para las mujeres y las niñas.

Women ARISE, la mayor coalición de organizaciones de mujeres que jamás se haya reunido en torno al VIH/sida, hará oír este reclamo durante la Conferencia Internacional de Sida que se desarrolla a partir de hoy en la ciudad de Viena. La **Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)** coordina este consorcio mundial de 35 redes de mujeres que se unió para visibilizar la presencia de mujeres y niñas en la reunión más importante sobre esta enfermedad.

"En Argentina, después de casi 30 años con la epidemia, todavía los programas y políticas de VIH/sida no enfrentan las necesidades de mujeres y niñas", aseguró **Mabel Bianco**, presidenta de FEIM y coordinadora del Comité Internacional de Sida de la Mujer (IAWC), y señaló su preocupación por que en los jóvenes de 15 a 24 años es el único grupo donde las mujeres predominan entre las nuevas infecciones por VIH. "Hay gran desconocimiento sobre cómo protegerse del VIH, por ejemplo muchas jóvenes no saben que a través del sexo oral también pueden contraer el virus", resaltó Bianco y reclamó por la implementación urgente de la educación sexual en todos los niveles escolares.

Además, Bianco señaló que "entre los profesionales de la salud persisten presiones hacia las mujeres que viven con VIH para que no tengan hijos y se esterilicen", a pesar de que actualmente se puede evitar la transmisión de madre a hijo con el tratamiento adecuado.

Las dificultades para negociar el uso del preservativo, la violencia hacia las mujeres dentro o fuera del hogar, el desconocimiento sobre las formas de protegerse, las situaciones de riesgo a las que se exponen las trabajadoras sexuales, las características propias del cuerpo femenino, la falta de acceso a los preservativos son algunos de los factores que dejan más expuestas a las mujeres frente al sida.

Contactos de prensa

En Viena

Roberta Sklar (en inglés)

917.704.6358 (cell) / robertasklar@yahoo.com

Mabel Bianco

54.11.15.6478.3635 / feim@feim.org.ar

En Buenos Aires

Gisela Grunin

54.11.15.4421.4264 / gisela@feim.org.ar